



PROFESSIONALS IN AGRONOMY



PESTİSİDLƏR

ƏLAVƏ MƏLUMAT ÜÇÜN
AŞAĞIDAKI ÜNVANA VƏ ƏLAQƏ TELEFONLARINA
MÜRACİƏT EDƏ BİLƏRSİNİZ.

Ünvan: Xırdalan-Binəqədi şossesi 3,
Bakı, Azərbaycan

Tel: +99412 341 90 32
+99412 408 20 57

Mob: +99470 992 07 09; +99450 339 70 16
+99450 730 50 72; +99470 733 07 09
+99470 744 07 09; +99450 272 77 73



MÜNDƏRİCAT

Curtaze	3
Kocide	4
İteral	5
Clip	6
Punch	7
Talendo	8
Lannate	9
Vydate	10
Avaunt	11
Granstar	12
Abalone	13
Bestseller	14
Bay Bay	15
Esiom	16
Omite	16
Sitrin	17
Balear	17
Sumi - Alfa	18
Pyrus	19
Proxanil	20
Scort	21
Syllit	21
Çoldazim	22
Pantera	23

CURZATE®

Üzüm və tərəvəzdə xəstəliklərə nəzarət

- Cymoxanil (4.2%) + Mis oxychloride (39.75%)
- İstifadə norması: 2.0-3.0 kg/ha
- Çiləmələr arası interval: 7-10 gün



Curzate® çiləmə zamanı dərmanla örtülməmiş hissəyə də təsir edərək qorunmasına kömək edir



Dərmanlama zamanı



Curzate®




Dərmanlanmamış

Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması
Xiyar	Yalançı unlu şəh (Pseudoperonospora cubensis)	2,0- 2,5 kq/ha və ya 200-250 qr/100 lt su
Pomidor	Fitoftora (Phytophthora infestans)	2,0- 2,5 kq/ha və ya 200-250 qr/100 lt su
Üzüm	Mildium (Plasmopara viticola)	2,5 kq/ha və ya 250 gr/ 100 lt su
Kartof	Fitoftora (Phytophthora infestans)	2,0- 2,5 kq/ha və ya 200-250 qr/100 lt su


KOCIDE® 2000

İstifadə sahələri




Təsiredici maddəsi:
% 53.8 Mis hidroksid
(% 35 metal Mis)
Formulu:
Suda Həll olan
Quru Axişqan (DF)

Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması
Bağ (alma, üzüm, gilə və s.)	Mildium (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 qr/100 lt su
Kartof	Fitoftora (<i>Phytophthora infestans</i>)	200 qr/100 lt su
Pomidor	Erkən yarpaq yanıqlığı (<i>Alternaria solani</i>)	200 qr/100 lt su



- Daha az parçacıq
- Daha az örtmə
- Daha az bioloji olaraq aktiv mis



- Daha çox parçacıq
- Daha yaxşı örtmə
- Daha çox bioloji olaraq aktiv mis



Alternaria solani



Phytophthora infestans



Plasmopara viticola

Bağ:

Dərmanlamağa yarpaqların diametri 2-3 sm oluncə başlanmalı, hava şərtlərinə və xəstəliyin inkişaf durumuna görə isə 7-10 gün intervalla davam etdirilə bilər




Plasmopara viticola



Phytophthora infestans



Iteral®



Lokal sistemik aktivlik



Dərman vurulan hissə

Famoxadone

- Qoruyucu
- Kutikullarda tutunma
- Yarpaq üzərində təkrar dağılım
- Zoospor öldürücü
- Uzun qalıcılıq
- Yağışdan yuyulmağa dayanıqlı

“Qalxan təsiri”

Cymoxanil

- İçəriyə nüfuz
- Lokal sistemik
- Müalicəedici
- Sporlanmanı əngəlləyici
- Yağışdan yuyulmağa dayanıqlı.

“Durdurucu təsir”

Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması	Məhsul yığım ilə son dərmanlama arasındakı müddət (gün)
Xiyar	Yalançı Unlu şəh (<i>Pseudoperenospora cubensis</i>)	40 qr/100 lt.su	3
Pomidor	Fitoftora (<i>Phytophthora infestans</i>)	40 qr/100 lt.su 400 qr/ha	3
	Erkən yarpaq yanıqlığı (<i>Alternaria solani</i>)	40 gr/100 lt.su 400 qr/ha	
Bağ	Mildium (<i>Plasmopara viticola</i>)	40 qr/100 lt.su	28
Kartof	Fitoftora (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 qr/ha	14

CLİP®

- Xəstəliklərlə mübarizədə Oxazolinedione qrupundan olan yeni qrup, yeni bir aktiv maddədir
- Aşağı dozalarda istifadə edilir.
- Bir çox bitkidə xəstəliklərə qarşı təsirlidir.
- 60-dan çox ölkədə qeydiyyatda alınmışdır.
- Geniş təsir əhatəsi vardır
- Aşağı istifadə norması: 800 gr/ha.
- Fərqli təsirə malik iki ayrı təsiredici maddənin sinerjisi
- Yağışdan yuyulmağa dayanıqlı.
- Məhsulda qalma problemi yox
- İnsanlara və ətraf mühitə qarşı etibarlı
- Dayanıqlılıq riski çox az



Pomidor, Kartof və Bağda



Alternaria solani

Phytophthora infestans

Plasmopara viticola

Bitki	Xəstəlik	İstifadə norması	Məhsul yığım ilə son dərmanlama arasındakı müddət
Xiyar	Yalançı unlu şəh (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	120 gr/100 lt.su	3
Pomidor	Fitoftora (<i>Phytophthora infestans</i>)	80 gr/100 lt.su (istixana) 800 gr/ha (tarla)	3
	Erkən yarpaq yanıqlığı (<i>Alternaria solani</i>)	80 gr/100 lt.su (istixana) 800 gr/ha (tarla)	
Bağ	Mildium (<i>Plasmopara viticola</i>)	80 gr/100 lt.su	28
Kartof	Fitoftora (<i>Phytophthora infestans</i>)	800 gr/ha (tarla)	14

Punch® 40 EC


Alma və üzümə xəstəliklərə effektiv nəzarət

- Təsiredici maddəsi: 400 qr/lt Flusilazole (Bis (4-fluorophenyl) (methyl) (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) silane
- Formulu: Konsentrat emulsiası (EC)
- Profilaktik və müalicəvi sistem təsirlidir
- Yüksək effektiv fungisiddir
- Bir çox vacib bitki xəstəliklərinə nəzarət edir
- Ətraf mühit üçün toksik deyildir
- Məhsulda qalıntısı yox dərəcəsindədir
- İstifadəçilər üçün təhlükəsizdir
- Dərmanlama profilaktik aparılmalıdır
- Çiləmələr arasında interval- 10-14 gün



4 saat

Dərman çiləndikdən 4 saat sonra yağı yağarsa dərmanlamamı təkrarlamağa gərək yoxdur.



*Almada dəmgil
(Venturia inaequalis)*

*Almada Unlu şəh
(Podospora leucotricha)*

Dərmanlanmamış

*Punch 40 EC ilə
dərmanlanmış*

- Flusilazole- u xüsusilə erkən, “yüksək risk” dövründə istifadə edin
- Sezon dövründə 4 dəfədən artıq istifadə etməyin
- İstifadə norması:**
- Almada Dəmgil (Venturia inaequalis): 5 ml/ 100 lt su**
- Üzümə Oidium (Podospora leucotricha): 3-5 ml/ 100 lt su**



1.Dərmanlama

2. Dərmanlama

3. Və növbəti dərmanlamalar

1. Dərmanlama: “Çəhrayı qönçə” fazasında
2. Dərmanlama : 70-80% ləçəklər töküldükdən sonra
3. Və növbəti dərmanlamalar : 10-14 gün fasilələrlə

Talendo®

Bağda Oidiuma Qarşı
Yeni Çözüm 40 EC

- Bağda Oidium (Uncinula necator) xəstəliyində istifadə edilən yeni bir fungusiddir.
- Təsiredici maddəsi: 200 qr/lt Proquinazid

- Proquinazid yeni bir grup olan quinazolinone qrupundandır
- Digər təsiredici maddə qruplarındakı dərmanlarla nəzarət edilməyən oidium xəstəliyi irqlərinə də təsir edir
- Qoruyucu xüsusiyyətli bir fungusiddir
- Uzun təsir müddətinə malikdir. Ən az 14 gün aralarla aparılan dərmanlamalar xəstəliyə qarşı müvəffəqiyyətli qoruma təmin edir
- Bağda seçiciliyi çox yüksəkdir, bağın inkişafına heç bir mənfi təsir göstərmir
- Talendo®-nun dərmanlanmış yarpaqlarda tutulması yaxşı olub, dərmanlamadan sonra dərmanın qurumasından sonra yağış yağarsa təkrar dərmanlamağa gərək yoxdur

Toxumalarda hərəkəti



Talendo® toxumada hərəkət edərək yeni yaranan bitki hissələrinə də çataraq onları da qoruyur

Proquinazid-in Lokal Sistemik Aktivliyi





Damlalar halında dərman verilməsi
(20 µl Proquinazid)



Buxarlanmanı əngəlləmək üçün
dərmanlanmış sahənin örtülməsi
(1 - 3 gün)

Bitki	Xəstəlik	İstifadə norması	Məhsul yığımı ilə son dərmanlama arasındakı müddət
Bağ	Oidium (Uncinula necator)	25 ml/100 lt su	28 gün



Dərmansız.
Oidiumla yoluxmuş salxımlar.

LANNATE®

Methomyl zərərvericilərə kontakt və maddə yolu ilə təsir edir

- Təsiredici maddəsi: 200 qr/lt Methomyl
- S-methyl-N-((methylcarbomyl)oxy)thioacetimidate
- Sinifi: Karbamat
- Formulu: Suda həll olan maye
- Methomyl bitki daxilində çox qısa müddətdə parçalanaraq asetonitril, karbondioksit, yağlar, şəkər və aminoasidlərə çevrilir
- Zərərvericilərin yumurta, tırtıl, süfrə və yetginlərinə qarşı təsirlidir
- Geniş təsir sahəsinə malikdir
- Ani təsirlili olub, dərmanlamadan bir neçə dəqiqə sonra təsiri görünməyə başlar
- Təsir müddəti təxminən 7 gündür
- Translaminar – lokal sistemik olub yarpaq daxilində və toxumalarda hərəkət edir, daşınır
- Məhsul yığımı ilə son dərmanlama arasındakı müddət qısadır (əsasən 1-7 gün).
- Mədəni bitkilərə seçiciliyi çox yüksəkdir



Tütündə Trips (Thrips tabaci)



Bağda Salxım güvəsi (Lobesia botrana)



Tütündə Yarpaq biti (Myzus persicae)


Bitki	Zərərverici	İstifadə norması	Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasındakı müddət(gün)
Bağ	Salxım güvəsi (Lobesia botrana)	200 ml / 100 lt.su	3 (süfrəlik) 14 (şərablıq)
Tütün	Yarpaq biti (Myzus persicae) Trips (Thrips tabaci) Yaşıl qurd (Heliothis armigera)	200 ml / 100 lt.su	5
Pambıq	Yaşıl qurd (Heliothis armigera)	350 ml / 100 lt.su	7
Alma	Yarpaq biti (Myzus persicae)	250 ml / 100 lt.su	14
			7
Pomidor	Yarpaq biti (Myzus persicae)	250 ml / 100 lt.su	3
Xiyar	Çiçək tripsi (Frankliniella occidentalis)	400 ml / 100 lt.su	3

GRANSTAR®

Enli yarpaqlı alağ otları ilə mübarizədə modern çözüm

- Sulfonilurea qrupundan olan herbisiddir
- Alağ otlarında "acetolactate synthase" enzimini durduraraq təsir edir
- Tərkibi %75 Tribenuron metyldir
- Çox aşağı dozalarda istifadə edilir
- İstifadəçilər və ətraf mühit üçün təhlükəsizdir
- Enli yarpaqlı alağ otlarına qarşı ön təhlükəsiz və sərfəli mübarizə
- Alağ otları kiçik olduqları dövrdə istifadə olunur
- Soyuq havalarda da istifadə etmək mümkündür
- Dar yarpaqlı alağ otlarına qarşı istifadə olunan herbisidlər (Puma Super, Illoxan, Topik) ilə qarışdırıla bilər
- Buğda və arpayı zərər verməz, yüksək məhsul təmin edə bilər
- Daşınması, ölçülməsi, istifadəsi çox asandır
- 50 qramlıq qablarda satılır

Yarpaq və Torpaqda Aktivliyi



Yarpaqlar tərəfindən alınır

Ən uyğun darmanlama dövrü



GRANSTAR-ın istifadə norması 12,5-15,0 q/ha

İstifadə zamanı:
Alağ otları çıxdıqdan sonra
alaqların erkən inkişaf dövründə istifadə olunur
(2-4 yarpaq ya da 5-10 cm böyüklükdə olduğu zaman)

Tək yarpaq → Bayraq yarpaq



GRANSTAR istifadə edildikdən
2 saat sonra yağış yağması
dərmanın təsirini əngəlləməz.
Darmanlamanın təkrarlanmasına
gərək qalmaz.

Alağ otları ilə daha yaxşı mübarizə və
yüksək məhsul üçün GRANSTAR-ı seçin...

Pantera 40 EC


Təsiredici maddə: Quizalofop – P- tefurye
Preparat forması: Emulsiya konsentratı



Bitki	Alağ otları	
	Birillik	Çoxillik
Şəkər çuğundur, pomidor	1,0-1,25 lt/ha	1,25-1,5 lt/ha
Kartof, soğan, xiyar, kələm	1,0-1,25 lt/ha	1,25-1,5 lt/ha
Günəbaxan, soya, lobya	0,75-1,0 lt/ha	1,25-1,5 lt/ha
Üzüm, bağ	2,0-2,5 lt/ha	2,5-3,0 lt/ha
Raps	0,75-1,0 lt/ha	0,75-1,0 lt/ha
Pambıq	1,0-1,25 lt/ha	1,25-1,5 lt/ha

YDATE® 10 G **YDATE® 10 L**

Sağlam və bol məhsul üçün Vydate- ı seçin...



- Vydate (oxamyl), karbamat qrupundan nematod və insektisid təsiri olan bir preparatdır.
- Maye və granül formaları vardır:
 - Vydate 24 L: Methanol əsaslı bir formuladır.
 - Vydate 10 L: Su əsaslı, aşağı uçuculuqlu bir formuladır.
 - Vydate 10 G: Kıl granulları üzərinə oxamyl püsgürülərək əldə edilən bir formuladır.
- Sistem təsirlidir:
 - Kökdən verildiyinə görə torpaqaltı zərərvericilərə qarşı təsirlidir.
 - Zərərvericilərə təmas və maddə yolu ilə təsir edir.
- Geniş təsir əhatəsi vardır:
 - Təxmini 80 ölkədə, 50 bitkidə, 100 zərərvericiyə qarşı istifadə olunur.
 - Sürətlə parçalandığına görə ətraf mühitə və yeraltı sulara qarışma, ekotoksikoloji risk və məhsulda qalma riski çox aşağıdır.
- Kökdən verildiyinə görə:
 - Tozlayıcı Bombus arılarına qarşı zərərli deyildir.
 - Yaşıl sahələrdə olan yararlı böcəklərə qarşı zərərsizdir.
- Ani təsirə malikdir:
 - Öldürücü dozalarda bir neçə saat ərzində zərərvericilərin olması müşahidə olunur.
 - Öldürücü dozadan aşağı normada istifadə edildikdə isə zərərvericilərin populyasiyasını təsir altında saxlayır.
 - Zərərvericilərin yetgin, sürfə, tırtıl formaları ilə yanaşı yumurtalarına da (nematod) təsir edir.

Vydate- nin təsir etdiyi müxtəlif zərərvericilər



Vydate ilə dərmanlanmış

Yarpaq biti

Ağqanadlı

Vydate® 10 G

Bitki	Zərərvericilər	İstifadə norması	Məhsul yığılması ilə son dərmanlama arasındakı müddət
Xiyar	Kök fir nematodu (Meloitogynae spp.)	5 kg/ 1000m ²	*
Pomidor	Kök fir nematodu (Meloitogynae spp.)	5 kg/ 1000m ²	*
Baş soğan	Soğan nematodu (Ditylenchus dipsaci)	6 kg/ 1000m ²	*

* Vydate® 10 G əkin günü və ya əkinəndən bir gün əvvəl cədvəldə göstərilən normada istifadə edilir.

Vydate® 10 L

Bitki	Zərərvericilər	İstifadə norması	Məhsul yığılması ilə son dərmanlama arasındakı müddət
Pomidor (İstixana)	Kök fir nematodu (Meloitogynae spp.) Ağ qanadlılar (Trialeurodes vaporariorum)	8,4 lt / ha	*
Xiyar (İstixana)	Kök fir nematodu (Meloitogynae spp.)	8,4 lt / ha	*
Baş soğan	Kök fir nematodu (Meloitogynae spp.)	8,4 lt / ha	*

* Vydate® 10 L pomidor və bəhsərdə Kök fir nematodlarına qarşı ilk dəfə əkinəndən həmin sonra 8,4lt/ ha, sonrakı 3 dəfə isə 14 gün fasilələrlə 4,15 lt/ ha normada damlama- suvarma ilə istifadə edilir.

Xiyarda isə Kök fir nematodlarına qarşı ilk dəfə əkinəndən həmin sonra 8,4lt/ ha, ikinci dəfə isə birinci dərmanlamadan 14 gün sonra 4,15 lt/ ha normada damlama- suvarma ilə istifadə edilir.

AVAUNT® 150 EC

- Ovisid və larvisiddir
- Tırtılların bütün inkişaf mərhələlərində aktivdir
- Zərərvericilərin dərmanlanmış yarpaqla qidalanması dayanır
- Dərmanlanmış yarpaqlara yumurta qoyulması da azalır
- Bioloji fəallıq 14 gün müşahidə olunur
- İstifadəsi çox asandır
- Fitotoksik deyildir çiləndikdən sonra yağışa qədər quruyarsa 80 mm yağış belə onun effektivini dəyişməz
- Çəndə 3 gün pH 5-10 və 2° - 40°C temperatur şəraitində saxlanıla bilər
- Bir sıra fəngisid və insektisidlərlə qarışdırıla bilər



Helicoverpa armigera (Pambiq sovkası)



Empoasca (Circirama)



Bir istifadə norması tırtılların bütün inkişaf mərhələlərinə nəzarət edir



Preparatın tətbiq edilmə norması (qr/–, kq/hm, l/hm)	Bitki	Zərərli obyekt	Preparatın tətbiq olunma üsulu, vaxtı, xüsusiyyətli	Gözləmə müddəti (təkrar)	Əl ilə (mexanikləşdirilmiş) işlərə başlama vaxtı
0,4-0,45	pambiq	pambiq sovkası	vegetasiya dövründə çiləmə	14 (4)	10 (4)
0,25-0,3	üzüm	yarpaq-bükən		3-10 (6-3)	
0,35	alma	meyvə-yeyən		14 (3)	
0,35-0,4	pomidor	pambiq sovkası		3 (4)	

Bestseller 200 SC

Təsiredici maddə: Alfa-sipermetrin 200 qr/lt

Preparat forması: Suda həll olan maye



Alfa sipermetrin zərərvericilərin əsəb sistemini iflic edərək onların ani ölümünə səbəb olur. Preparatın maksimal effekti temperatur 15 – 20 C olduqda baş verir. Temperaturun qalxması effektivliyi aşağı salır. Preparat səhər və axşam vaxtları tətbiq olunmalıdır. Zərərvericilərin bütün inkişaf fazasında effektivdir. Ani təsir edərək zərərvericilərin kütləvi məhv olmasına səbəb olur.

Bitki	Zərərvericilər	İstifadə norması lt/ha
Kartof	Kolorado böcəyi	0,07 - 0,10
Üzüm	Yarpaqbükən	0,15 - 0,18
Alma	Meyvəyeyən, yarpaqbükən	0,10 - 0,15
Otlaq	Çəyirtkə	0,15 - 0,20
Taxıl	Zərərli, bağacıq, mənənə, sovka, taxıl milçəyi	0,05 - 0,06

BAY BAY 20% K.E.

Təsiredici maddə: Amitrats 200 qr/lt

Preparat forması: Emulsiya konsentratı



Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması lt/ha
Alma	Meyvəyeyən, yarpaqbükən, gənə, yastıca, güvə, mənənə	3,0-4,0
Şaftalı	Gənə, mənənə	3,0-4,0
Armud	Gənə	3,0-4,0

Esiom

Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması lt/ha
Kartof	Kolorado böcəyi	0,5
Xiyar, pomidor (qapalı qrun)	Ağ qanadlı kəpənək, mənənə, minalayıcı milçək	0,4-0,5
Taxıl	Zərərli bağacıq, mənənə, sovka, taxıl milçəyi	0,4

Omite Akarisid

Təsiredici maddə: Proparqit 570 qr/kq
Preparat forması: Suda həll olan maye



Kontakt təsirə malik olub, yüksək sürətlə nüfuz edir. Geniş təsir sahəsinə malikdir. Gənələrin aktiv inkişaf fazasında (tırtıl, sürfə və yetkin) onları məhv edir. Yumurtalara təsir etmir, tırtılları məhv edir. Cütlərin nəsil artırma dövründə də təsirlidir. Temperatur 20°C- dən yuxarı olduqda təsiri daha da artır.

Bitki	İstifadə norması lt/ha	Son dərmanlama ilə məhsul yığımlı arasındakı müddət (gün)
Tərəvəz bitkiləri (açıq sahə üçün)	1.5 - 2.0	20
Bostan bitkiləri	1.5 - 2.0	20
Alma, armud, gavalı	1.5 - 2.0	20
Gilas	0.9 - 1.2	20
Çiyələk	0.9 - 1.2	20
Üzüm	1.2 - 1.6	20
Subtropik bitkilər	1.5 - 1.8	20

SITRIN 50% EC

Təsiredici maddə: Çipermetrin 500 qr/lt
Preparat forması: Emulsiya konsentratı

Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması lt/ha
Kartof	Kolorado böcəyi	0,10 - 0,15
Üzüm	Yarpaqbükən	0,15-0,18
Alma	Meyvəyeyən	0,15 - 0,20
Taxıl	Zərərli, bağacıq, mənənə, sovka, taxıl milçəyi	0,10 - 0,15

Abalone 1,8 E.C

Təsiredici maddə: Abamectin
Preparat forması: Emulsiya konsentratı

Bitki	Zərərvericilər	İstifadə norması lt/ha
Pambıq	Mənənə, trips, tor gənəsi	0,3-0,4
Üzüm	Gənə	0,2-0,3
Xiyar, pomidor	Gənə, minalayıcı milçək	0,5-0,8
Qərənfil, qızılgül	Gənə	0,3-0,4



Sumi - Alfa

Təsiredici maddəsi: Esfenvalerat 50 qr/lt

Preparat forması: Emulsiya konsentratı

Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması lt/ha
Pambıq	Pambıq mənənəsi	0,3-0,5
	Cırcıramalar və pambıq biti, ağ kəpənək, tripslər, sovkalar və yarpaqbükənlər	0,5-0,6
Şəkər çuğunduru	Sovkalar, mənənələr, çuğundur biti, çuğundur böcəyi	0,2-0,3
Buğda, arpa	Mənənələr, bitlər, taxıl milçəyi	0,2-0,25
	Bit bağacıq	0,2-0,3
Qarğıdalı	Pambıq sovkası, qarğıdalı kəpənəyi, yulaf milçəyi	0,3-0,4 0,5
Tərəvəz bitkiləri	Ağ kəpənək, sovkalar, güvələr, mənənələr, bitlər, taxıl biti, tripslər	0,2-0,3
Noxud, lobya	Tripslər, mənənələr, noxud yarpaqbükəni, noxud taxılbiti	0,15-0,2
	Paxla qurdu, noxud meyvəyeyəni	0,3
Meyvə bağları (çayırdaşlilər və tumlular)	Meyvəyeyən, yarpaqbükənlər, yarpaq minayacıları, güvələr	0,5-1,0
Üzüm	Üzüm yarpaqbükəni, salxım yarpaqbükəni	0,4-0,6
Çiyələk, moruq	Mənənələr, çiyələk çiçəkbiti, moruq güvəsi	0,25-0,50

Balear 720 SC



Təsiredici maddəsi: Xlorotalonil 720 qr/l

Preparat forması: Emulsiya konsentratı

Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması lt/ha
Alma	Dəmgil	1,5 - 2,0
Üzüm	Unlu şəh, mildium	1,0-1,5
Pomidor	Boz çürümə	1,5
Gavalı	Monoloz, klyasterosporioz	1,5-2,0

Pyrus 400 SC

Təsiredici maddə: primetanil 400 qr/lt

Preparat forması: suda həll olan maye

Preparat alma bağlarında dəmgil və monolioza qarşı yüksək effektivdir. Çiçəkləmə vaxtı xəstəliyin əmələ gəlməsinə və inkişafına soyuq və nəmli hava şərait yaradır. Belə hava şəraitində çiçəklənmə gecikir, mayalanma pisləşir, göbələklərin sporartması güclənir və yeni –yeni yoluxmalara səbəb olur. Dəmgil və monolioza qarşı ən yaxşı effekt çiləmələri çiçəkdən əvvəl və sonra aparıldıqda olur. Yüksək effektiv funqisiddir. Toxumalara daxil olaraq tez hərəkətə keçir. Yağışdan yuyulmağa davamlıdır. Aşağı temperaturda effektivdir.



Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması lt/ha
Alma	Dəmgil, meyvə çürüməsi	1,0-1,4
Üzüm	Boz çürümə	2,0-2,5
Armud, heyva	Dəmgil, Boz çürümə	1,0
Kələm, xiyar, badımcın	Alternarioz, boz çürümə	1,5 - 2,0
Gül	Boz çürümə	1,5 - 2,0
Çiyələk	Boz çürümə	1,5 - 2,0
Pomidor (qapalı qırt)	Çürümələr	1,5-2,0

Proxanil SC

Təsiredici maddə: propamokarp hidroxlorid 400 qr/lt + simoksanil 50 qr/lt

Preparat forması: emulsiya konsentratı



Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması lt/ha
Kartof	Fitoftoroz, kartofun alternariozu	2,5
Xiyar	Unlu şəh, antraknoz	2,5
Pomidor	Fitoftoroz, alternarioz	2,5
Üzüm	Mildium	2,0-2,5

SCORT 25% E.C

Təsiredici maddə: Difenokonazol 250 qr/lt

Preparat forması: Emulsiya konsentratı

Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması lt/ha
Alma, armud	Dəmgil, unlu şəh	0,20-0,25
Ərik, şaftalı	Klyasterosporioz, yarpaq qıvrılması	0,2
Gilas, albalı	Kokkomikoz	0,2

Syllit 400 SC

Təsiredici maddə: Dodin 400 qr/lt

Preparat forması: Suda həll olan maye.



- Vegetasiyanın ilkin fazasında infeksiyanın inkişafını dayandırır.
- Preparatın istifadəsi aşağı temperaturda daha effektivdir.
- Yoluxma çox olarsa belə yüksək effekt almaq mümkündür.
- Çiləmə aparıldıqdan 2-3 saat sonra yağışdan yuyulmağa davamlıdır. Translaminardır – yarpaq daxilində toxumalarda hərəkət edir, daşınır.
- Çiləmədən bir neçə saat sonra preparat öz effektini göstərir.
- Yaşıl konus fazasında və çiçəkləmənin əvvəlində tətbiqi daha məqsəduyğundur.

Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması lt/ha
Alma	Dəmgil, meyvə çürüməsi	1,5-2,0
Şaftalı	Dəmgil, yarpaqların qıvrılması	1,5 - 2,0
Heyva	Dəmgil, monolioz	1,5

Çoldazim

Təsiredici maddə: Karbendazim 500 qr/lt

Preparat forması: Suspenziya konsentratı



Bitki	Xəstəliklər	İstifadə norması lt/ha
Alma	Dəmgil, meyvə çürüməsi	0,3-0,4
Çəyirdəklilər	Monolioz	0,75
Üzüm	Oidium	0,6
Kartof	Quru çürümə	0,1-0,15

